

Oxitetraciclina 200 LA

Solución Inyectable
Vía intramuscular
Para uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (dihidrato), 200 mg

Excipiente c.s.p., 1 ml

PROPIEDADES

La **OXITETRACICLINA** es un antibiótico bacteriostático que actúa sobre los ribosomas bacterianos inhibiendo la síntesis proteica. Su espectro de acción es muy amplio, abarcando gérmenes Gram positivos, Gram Negativos, ciertos grandes virus, protozoos, espiroquetas, rickettsias, microplasmas y clamidias.

Gracias a su fórmula retard, mediante la única inyección de Oxitetraciclina 200 L.A., puede realizarse una antibiotico-terapia completa, ya que se logran concentraciones sanguíneas eficaces durante 3 días.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- **Bóvidos**

Enfermedad de transporte, enteritis y gastroenteritis, neumopatías infecciosas, metritis, mastitis y síndrome MMA.

- **Cerdos**

Infecciones broncopulmonares, enteritis y gastroenteritis infecciosas, metritis, pasteurelisis y artritis.

- **Óvidos y Caprinos**

Infecciones del aparato respiratorio, enteritis, abortos, infecciones, pielonefritis y brucelosis.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

- **Bóvidos, Cerdos, Óvidos y Caprinos**

Inyección única a razón de 1ml/10kg p.v. En los casos severos puede repetirse la inyección a las 72 horas,

Vía Intramuscular

PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar dos puntos de inyección cuando la cantidad a administrar es superior a 20 ml en bóvidos, 10 ml en cerdos y 5 ml en óvidos y caprinos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales que sufran de insuficiencia renal ni durante los primeros días de vida.

EFECTOS SECUNDARIOS

La alta concentración en principio activo y la acción prolongada pueden originar una ligera tumefacción transitoria en el punto de inyección que desaparece espontáneamente. Así mismo, en bóvidos pueden desarrollarse reacciones alérgicas que se manifiesten con edema en el punto de inyección, pero desaparece espontáneamente.

INTERACCIONES

No se han descrito

La oxitetraciclina se fija a los huesos de los animales jóvenes frenando su desarrollo, con lo cual se aconseja no administrar la especialidad durante los primeros meses de vida.

SOBREDOSIFICACIÓN

Debido a la posología fijada es muy improbable que se produzcan casos de sobredosificación.

En tratamientos prolongados con altas dosis pueden aparecer hepatotoxicidad, en estos casos, cesar el tratamiento y administrar protectores hepáticos.

PERIODO DE SUPRESIÓN

- **Carne:** 22 días

- **Leche:** 3 días (6 ordeños)

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado a menos 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y **“FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**.

La solución puede oscurecerse con el tiempo, no implicando ello ninguna pérdida de actividad.

PRESENTACIONES

Viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml

Dispensación con receta veterinaria

REGISTRO SANITARIO

2C1-4429-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear

Vía Quinindé km 2.3

Santo Domingo - Ecuador