

# Multivitamin

Polivitamínico, calcificante y energizante

Solución inyectable

Para uso veterinario

## COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Vitamina A palmitato, 550 mg

Vitamina E Acetato, 500 mg

Vitamina D<sub>2</sub> 17,5 mg

Gluconato de Manganeso, 500 mg

Gluconato de Magnesio, 100 mg

Gluconato de Calcio, 800 mg

Gluconato de Cobre, 150 mg

Gluconato de Zinc, 150 mg

Cloruro de Potasio, 200 mg

Citrato de Hierro, 350 mg

Glicerofosfato de Sodio, 2000 mg

Atp, 200 mg

Edta Di Sódico, 150 mg

Metabissulfito de Sodio, 200 mg

Nipagin, 200 mg

Tween 20, 5 ml

Excipientes c.s.p., 100 ml

## PROPIEDADES

Polivitamínico utilizado como tratamiento auxiliar en infestaciones parasitarias, suplementación vitamínica en caso de alimentos pobres en ellas. Para prevenir enfermedades por carencia de Vitaminas A, D y E. (raquitismo, osteomalacia, cojeras, distrofia muscular, anorexias, adelgazamiento, falta de vitalidad, abortos). Como tratamiento auxiliar a las enfermedades infecciosas. Como factor de crecimiento y engorde.

## ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos.

## INDICACIONES

Polivitamínico, Calcificante, Energizante de inmediata biodisponibilidad. Se utiliza en la prevención y tratamiento de enfermedades producidas por deficiencias vitamínicas y minerales en la dieta diaria, tales como raquitismo, osteomalacia, cojeras, distrofia muscular, anorexias, adelgazamiento, falta de vitalidad, abortos como tratamiento auxiliar a las enfermedades infecciosas bacterianas y parasitarias.

Como factor de crecimiento y engorde.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

El producto se administra por vía parenteral subcutánea o intramuscular, a razón de:

### DOSIS

- **Bovinos y equinos:** 10ml / animal **Ovinos y caprinos:** 3ml / animal
- **Porcinos adultos:** 5ml / animal **Terneros y potrillos:** 5ml / animal
- **Lechones y corderos:** 1ml / animal Como curativo: (en estadios carenciales): Aplicar cada 15 días. Como preventivo: engorde, destete, pre-servicio, pre-parto, como complemento con desparasitaciones, vacunaciones, etc : Aplicar cada 30 - 45 días.

## CONTRAINDICACIONES

El producto no presenta contraindicaciones. Igualmente, no se recomienda suministrar en caso de demostrada hipersensibilidad a alguno de los principios activos.

## INTERACCIONES

No se han descrito, pero de preferencia se recomienda aplicarlo solo.

## TIEMPO DE RETIRO

- **Carne:** 0 días
- **Leche:** 0 días

## SOBREDOSIFICACIÓN

A la dosis recomendada, no pueden darse casos de sobredosificación

## PRESENTACIONES

Viales x 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml

## REGISTRO SANITARIO

9B3-1-8828-AGROCALIDAD

## CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, a menos de 30°C, al abrigo de la luz y “**FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**”.

## IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear  
Vía Quinindé km 2.3  
Santo Domingo - Ecuador