

IVER LONG^A 3,15%

Antiparasitario Interno y Externo
Solución Inyectable
para uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Ivermectina, 3.15 g
Excipiente c.s.p, 100 ml

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos y Ovinos

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en Bovinos y Ovinos:

- **BOVINOS:**

- **Parásitos Gastrointestinales:** Ostertagia ostertagi (incluyendo estadios inhibidos), Haemonchus placei, Ostertagia iyarata, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus columbriformisi, Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Strongylus papillosus, Toxocara vitulorum, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum.

- **Parásitos Pulmonares:** Dictyocaulus vivíparus.

- **Piojos (chupadores):** Linognathus vituli, Haemotopinus eurytarnus, Solenopotes capillatus.

- **Piojos (masticadores):** Damalinia bovis (ayuda en el control de los mismos).

- **Garrapatas:** Boophilus microplus.

- **Dípteros:** Haematobia irritans.

- **Ácaros de la Sarna:** Psoroptes communis (var. bovis), Sarcoptes scabiei (var. bovis), Chorioptes bovis

- **Miasis:** Cochliomya hominivorax.

- **Ura:** Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum.

- **OVINOS:**

- **Parásitos Gastrointestinales:** Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus vitrinus, Trichostrongylus columbriformis, Nematodirus spathiger, Nematodirus filicollis, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum columbianum, Chabertia ovina, Trichuris ovis, Strongyloides papillosus, Gaigeria pachycellis.

- **Parásitos Pulmonares:** Protostrongylus rufescens, Dictyocaulus filaria. Linognathus vituli, Haemotopinus eurytarnus, Solenopotes capillatus.

- **Ácaros de la Sarna:** Psoroptes communis (var. ovis), Sarcoptes scabiei (var. ovis), Psorergates ovis

- **Piojos:** Damalinia ovis, Linognathus ovillus, Linognathus pedalis.

- **Miasis:** Cochliomya hominivorax, Cochliomya macellaria, Lucilia spp.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La vía de administración es parental mediante inyección subcutánea, sugiriéndose como punto de inoculación, delante o detrás de la paleta.

DOSIS

1 ml de IVERLONG L.A. 3.15% por cada 50 kg p.v. en Bovinos y Ovinos (630 µg / kg p.v.).

El producto se presenta listo para usar.

CONTRAINDICACIONES

No suministrar en animales muy debilitados, estresados o febriles. No administrar dentro de los 60 días antes del parto. No utilizar por vía endovenosa o intramuscular. En regiones de riesgo de enfermedades clostridiales realizar previamente la respectiva vacunación.

TIEMPO DE RETIRO

- **Carne:** 122 días

- **Leche:** No usar

SOBREDOSIFICACIÓN

Dado el amplio margen de seguridad de la Ivermectina, es improbable que se den casos de sobredosis.

PRESENTACIONES

Envases contenido 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, a menos de 30°C, al abrigo de la luz y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

REGISTRO SANITARIO

13A-3B-13230- AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear

Vía Quinindé km 2.3

Santo Domingo - Ecuador